



PROCOLO

# 20

## ***Toma de muestras oronasofaríngeas***

Es de aclarar que no son muestras para COVID-19, pero se manejarán como si lo fueran e incluyen: cultivo para *Streptococcus* grupo A, moco nasal para eosinófilos, extendido de faríngea para manipuladores de alimentos.

1. **Lavarse las manos con agua y jabón.**
2. **Colocarse:** gorro para el pelo, gafas, protector facial, doble guante, tapabocas N95 y bata antifluidos (sobre la bata que se usa de rutina en el laboratorio).
3. **Sentar** al paciente si es adulto, o **acostarlo** si es niño.
4. **Tomar la muestra como está establecido.**

5. **Luego de tomar la muestra,** retirar el primer par de guantes y descartarlos.
6. **Con el segundo par de guantes,** retirarse el protector facial, gafas, gorro, tapabocas N95 y bata antifluidos.

Los guantes, gorro y bata antifluidos deben descartarse en bolsa roja.

7. **Realizar limpieza** del protector facial con alcohol y guardar el tapabocas N95 en bolsa de papel.
8. **Lavarse las manos con agua y jabón.**
9. **No se toque los ojos, la nariz ni la boca.**

**Nota: para el manejo del tapabocas N95, ver instrucciones del manual de bioseguridad de la OMS.**

